

# 服用 Digoxin 病童的注意事項

1. 依醫師開立的時間服用，一般是每隔十二小時給一次(如：早上九點及晚上九點)。
2. 請固定給藥的時間為進食前一小時或進食後二小時。
3. 小心的給予藥物，確定藥物服入正確劑量。
4. 服用錠劑時，在每日相同的時間服藥，若引起肚子不舒服可以與食物一起服用；水劑方面，最好不要將藥物與其它食物或液體混合。
5. 錯過時間時，儘可能的趕緊補服藥物。如果已經超過 12 小時就不要再服用藥物了，等到下次的服用時間再服用即可。
6. 若是連續忘記給予藥物超過兩次時請記錄並通知醫師。
7. 不要因為忘記給藥而自己增加劑量或縮短給藥間隔。
8. Digoxin 的副作用：
  - 輕度：食慾不振、想吐、頭痛
  - 中度：腹瀉，心悸，視力模糊
  - 重度：腹痛，心律不整
9. 使用藥物是為了保護心臟功能，避免心衰竭而用；依醫師指示使用下副作用的可能性極低。為了心臟病兒童的健康，請按時服用及門診追蹤。
10. 服用此藥的 6 小時內，請勿服用制酸劑(胃藥)、陰離子交換樹脂、貴舒醇散(降血脂藥物)、白陶土果膠(止瀉劑)或安胃潰敏錠(治療胃潰瘍藥物)，以免影響藥效。

