

硝酸甘油片使用注意事項

一、 NTG：硝酸甘油片，俗稱救心，其作用為擴張冠狀動脈，迅速治療胸痛發作

二、 何時該服用 NTG 呢？

1. 明顯的胸痛、胸悶(如胸口有壓迫感、燒灼感，感覺窒息，胸骨下或上腹有不適或疼痛)
2. 胸痛持續超過 20 分鐘以上
3. 胸痛輻射至頸部，下巴或左手臂
4. 有心臟病史，且發作症狀和上次發病相同



三、 硝酸甘油片服用的方法

胸痛時，每隔五分鐘舌下含一錠(須坐下)，以免頭暈跌倒，如果連續含三錠症狀仍未改善，請立即於家人陪同或急電 119 就醫，並告知醫護人員已服用數量。

四、 硝酸甘油片服用時的注意事項

1. 應隨時攜帶藥片，室溫保存，避光並保持乾燥(保存於原藥罐，勿分裝)。
2. 有效期限為開封後六個月，已開封且超過六個月未使用的藥粒應丟棄。
3. 含藥後，輕微舌下燒灼、辣痛感、頭痛是正常反應。
4. 含服時不宜站著服用，因副作用也可能會引起血壓降低、頭暈。
5. 不可與威而剛、樂威壯、犀利士等藥物併用。
6. 服藥後勿從事機械操作、開車等須集中注意力工作。
7. 請放置於兒童不易取得地方。



製作單位：9B

製作日期：96.3

修訂日期：111.08

04-1-004



國立成功大學醫學院附設醫院

關心您